

Lypsylehmien hoitoon sallitut antibiootit 3.4.2012

Injektiovalmiste Valmistenimi	Vaikuttava aine	Varoaika maidolle	MRL arvo mikrog/kg	Delvotest herkkyys, mikrog/kg
Betalaktaamit				
Amovet	Amoksisilliini	4 vrk	4	3
Betamox	Amoksisilliini	4 vrk	4	3
Duphamox	Amoksisilliini	4 vrk		3
Duphacillin	Ampisilliini	4 vrk	4	3
Cefenil	Keftiofuri	0 vrk (Heng.tulehdukset ja tartunnalliset sorkkasairaudet)	100	Delvotestin herkkyyttä ei ole testattu
Naxcel	Keftiofuri	0 vrk (Naudan akuutti interdigitaalinen nekrobasilloosi = sorkkavälin ajotulehdus)	100	Delvotestin herkkyyttä ei ole testattu
Ethacillin	Penisilliini	6 vrk	4	2
Geepenil	Penisilliini (vesiliukoinen)	2 vrk	4	2
Mamyzin	Penisilliini (peneta-maattihydrojodidi)	4 vrk	4	2
Penovet	Penisilliini	6 vrk	4	2
Procapen	Penisilliini	6 vrk	4	2
Tetrasykliinit				
Alamycin LA	Oksitetrazykliini	7 vrk	100	680
Duphacycline LA	Oksitetrazykliini	7 vrk	100	680
Engemycin LA	Oksitetrazykliini	4 vrk	100	680
Terramycin	Oksitetrazykliini	4 vrk	100	680
Terramycin LA	Oksitetrazykliini	7 vrk	100	680
Kinolonit				
Advocin	Danofloksasiini	3 vrk	30	1000-2000
Baytril	Enrofloksasiini	4 vrk	100	1000-1500
Fenoflox	Enrofloksasiini	lhon alle 84 h (7 lypsyä), laskimoon 72 h (6 lypsyä)	100	1000-1500
Marfloquin	Marbofloksasiini	Kerta-annos 8 mg/kg, varoaika 72 h. Annostus 2 mg/kg, kerran päivässä, 3 päivän ajan, varoaika 36 h.	75	Uusi valmiste. Ei ole ehditty testata.
Sulfonamidit				
Oriprim	Sulfadiatsiini	4 vrk	100	170
Tribrissen	Sulfadiatsiini	7 vrk	100	170
Borgal	Sulfadoksiini	4 vrk	100	>300
Duoprim	Sulfadoksiini	4 vrk	100	>300

Utretuubit Valmistenimi	Vaikuttava aine/ vaikuttavat aineet	Varoaika maidolle, vrk	MRL arvo mikrog/kg	Delvotest herkkyys, mikrog/kg
<i>Betalaktaamit</i>				
Ampiclox	Ampisilliini ja kloksasilliini	Hoidettu neljännes 5 vrk, muut 2 vrk	4 30	3 16
Kloxerate	Ampisilliini ja kloksasilliini	Hoidettu neljännes 5 vrk, muut 2 vrk	4 30	3 16
Kefa-Nova	Kefaleksiini	Hoidettu neljännes 3 vrk, muut 1 vrk	100	70
Carepen	Penisilliini	6 vrk	4	2
Wedeclox Mastitis	Kloksasilliini	Hoidettu neljännes 6 vrk, hoitamaton 4 vrk	30	16
<i>Linkosamidit</i>				
Pirsue	Pirlimysiini	5 vrk	100	20-100

Umpeenpanotuubit Valmistenimi	Vaikuttava aine/ vaikuttavat aineet	Varoaika maidolle, vrk	MRL-arvo mikrog/kg	Delvotest herkkyys, mikrog/kg
Bovaclox	Ampisilliini ja kloksasilliini	Maito 5 vrk poikimisesta. Jos ummessaoloaika on alle 42 vrk, on maidon varoaika 47 vrk lääkkeen annostelusta	4 30	3 16
Kloxerate retard	Ampisilliini ja kloksasilliini	Maito 47 vrk = Maito 5 vrk poikimisesta. Jos ummessaoloaika on alle 42 vrk on varoaika 47 vrk lääkkeen annostelusta.	4 30	3 16
Orbenin retard	Kloksasilliini	Maito 5 vrk poikimisesta. Jos lääkkeenannon ja poikimisen välinen aika on lyhyempi kuin 28 vrk, on maidon varoaika 32 vrk annostelusta.	30	16
Umpimycin	Penisilliini, penetamaattihydrojodidi= pensilliini ja framysetiini	Maito 5 vrk poikimisesta. Jos lääkkeenannon ja poikimisen välinen aika on lyhyempi kuin 25 vrk, on maidon varoaika 30 vrk.	4 MRL arvoa ei löydy	2 Framysetiiniä ei ole ollut saatavana
Vonapen retard	Penisilliini ja neomysiini	Maito 5 vrk. Jos lääkkeenannon ja poikimisen välinen aika on lyhyempi kuin 30 vrk, on varoaika 35 vrk.	4 1500	2 340